

# LEZIUNILE VIRALE DE TIP PROLIFERATIV ALE MUCOASEI ORALE. PARTEA A II-A. VIRUSUL EPSTEIN BARR ȘI VIRUSUL HERPES TIP 8

Ș. ȚOVARU, IOANINA PĂRLĂTESCU, C. VLĂDAN, MIHAELA ȚOVARU

## Rezumat

*În general, manifestările bucale ale VEB și HHV8 sunt rar întâlnite în practica stomatologică. De cele mai multe ori apar la persoanele cu depresii imunitare fie de cauză infecțioasă (infecții HIV) sau depresii terapeutice și foarte rar la imunocompetenți.*

*Cu toate acestea aspectul lor este important de cunoscut datorită faptului că ele reprezintă un semnal de alarmă asupra stării de imunitate a pacienților respectivi, de care aceștia nu sunt conștienți uneori.*

*Leziunile produse de aceste virusuri la nivelul cavității bucale sunt în general asimptomatice în faza de debut. Pe măsura agravării bolii de fond ele pot ajunge uneori la dimensiuni mari generând tulburări funcționale de diferite grade iar tratamentul va fi adaptat în funcție de gravitatea și intensitatea lor, de cele mai multe ori având un caracter paleativ.*

*Virusul Epstein-Barr produce la pacienții imuno-deprimați următoarele tipuri de leziuni: leucoplazie păroasă, limfoame cu debut endobucal sau limfoame cu localizări în limfonodulii cervicofaciali.*

*Infecția cu Virus Herpetic tip 8 (HHV8) produce sarcomul Kaposi care este o afecțiune sistemică, malignă, multifocală cu origine în endoteliul vascular și cu o evoluție clinică variabilă. Cel mai frecvent se întâlnesc leziuni cutanate dar leziunile pot apare și la nivelul mucoaselor, sistemului limfatic și viscere-în special plămânul și tractul gastrointestinal.*

**Cuvinte cheie:** EVB, HHV8, leucoplazia păroasă, limfoame orale, sarcom Kaposi oral