

PREVALENȚA MANIFESTĂRILOR CUTANEO-MUCOASE ȘI CORELAȚIILE CU STATUSUL IMUN LA COPII INFECTAȚI CU VIRUSUL HIV

M. MIHĂLCEANU, V. FEIER, C. SOLOVAN

Rezumat

Studiul de față urmărește stabilirea prevalenței manifestărilor cutaneo-mucoase la copii infectați cu virusul HIV, decelarea particularităților acestora, și evidențierea corelațiilor care există între patologia cutaneo-mucoasă și statusul imun al pacienților în momentul diagnosticului.

Studiul a fost efectuat prospectiv pe o perioadă de 3,5 ani și a inclus 178 copii infectați cu virusul HIV non vertical, cu vârsta sub 16 ani. În momentul diagnosticului 95% din subiecți se aflau în stadiile B și C.

Leziuni cutaneo-mucoase au fost prezente la 80% din subiecți, în următoarea frecvență: candidoza oro-faringiană 53,3%, prurigo cronic 32,8%, infecțiile herpetice 23,4%, infecțiile cu virusul papiloma 15,6%, infecțiile stafilococice 15,6%, erupții alergice diverse 12,4, zona zoster 10,9%, xeroza cutanată 9,3%, scabia 8,4% , leucoplazia orală păroasă 6,2% , moluscumul contagiosum și infecțiile cu dermatofiți 1,1%.

În concluzie infecțiile oportuniste sunt cele mai frecvente manifestări cutaneo-mucoase la copii infectați HIV și se corelează cu statusul imun scăzut al acestora. Nu a fost decelată patologie tumorală cutaneo-mucoasă.

Cuvinte cheie: *patologia cutaneo-mucoasă, infecție HIV, copii.*