

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, CLINICE, BACTERIOLOGICE ȘI TERAPEUTICE ÎN STAFILOCOCIILE CUTANATE URMĂRITE ÎN CLINICA DERMATOLOGICĂ DIN IAȘI ÎN ANUL 2004

ZENAIDA PETRESCU , D. VÂȚĂ, DACIANA BRĂNIȘTEANU, GABRIELA PETRESCU,
LAURA GHEUCĂ SOLOVĂSTRU, LAURA STĂTESCU, AURORA AMBĂRUȘ, A. ENACHE,
AIDA BĂDESCU

Rezumat

Infecțiile cutanate produse de S. aureus includ manifestări clinice variate, uneori cu evoluție severă.

Studiul a fost întreprins pe 53 pacienți cu stafilococii cutanate, 32 de sex masculin și 21 de sex feminin, 26 din mediul rural și 27 din urban, cu vârsta între 8 luni și 85 de ani urmăriți în Clinica Dermatologică din Iași în anul 2004. Infecțiile stafilococice au reprezentat 2,26 % din totalul pacienților internați și 43,03% din totalul piodermitelor primitive. Formele clinice cel mai frecvent întâlnite au fost reprezentate de furuncule (13 cazuri), impetigo bulos (11 cazuri), foliculite superficiale (10 cazuri), botriomicom (10 cazuri). Alte manifestări au fost mai rare: sicozis al bărbii (2 cazuri), perionixis (2 cazuri), hidrosadenită (1 caz) și abces plantar (1 caz).

Terapia etiologică a constat în oxacilină în 39,6% din cazuri, amoxicilina în 30,1% din cazuri, cefalosporine în 8,4% din cazuri. 13,2% au primit ciprofloxacina și 7,4% fucidină. Terapia topică asociată în unele cazuri a inclus : fucidin cremă, gentamicină unguent, cloramfenicol unguent ș.a.

Cuvinte cheie: stafilococii cutanate.