

DERMATITĂ PERIORALĂ GRANULOMATOASĂ LA O FEMEIE - EFICIENȚA TRATAMENTULUI CU AZITROMICINĂ

IULIANA GEORGESCU, GABRIELA PÎRGĂ, FLORENTINA ILEANA CRISTOVICI, DOINA CAZACU

Rezumat

Dermatita granulomatoasă periorală este o varietate neobișnuită a dermatitei periorale cu aspect morfoopatologic sarcoid-like.

Noi raportăm o tânără femeie cu numeroase leziuni micropapuloase de culoare roșie afectând ariile periorală și perinazală care a apărut după aplicarea de corticosteroizi topici pentru un ușor eritem al feței, corelat cu folosirea unei creme cosmetice.

Examinarea histopatologică descoperă o reacție granulomatoasă sarcoid-like care confirmă o dermatită granulomatoasă periorală. Pacienta primește tratament topic și sistemic cu eritromicină. Leziunile se ameliorează dar nu complet. Noi am înlocuit eritromicina cu azitromicina, macrolidul cu concentrație tisulară înaltă, probabil din cauza perioadei de înjumătățire mare a acestuia.

Azitromicina a fost administrată în doza zilnică de 500 mg trei zile consecutiv în prima săptămână, 500 mg pe zi două zile în săptămâna a doua și 500 mg zilnic o zi în următoarele două săptămâni.

După acest tratament leziunile s-au remis complet.

Concluzie: *Azitromicina poate fi considerată o alternativă terapeutică valabilă în tratamentul dermatitei granulomatoase periorale.*

Cuvinte cheie: *dermatită periorală granulomatoasă, azitromicină.*