

VALOAREA PREDICTIVĂ A EXAMENULUI VULVOCOLPOSCOPIC PENTRU DIAGNOSTICUL DISTROFIILOR VULVARE DIN PERIMENOPAUZĂ

MARCELA JIFCU, LILIANA NOVAC, SMĂRĂNDIȚA COTARCEA

Rezumat

Obiectiv: Scopul studiului nostru este de a evalua vulvosopia ca metodă diagnostică precoce în distrofiile vulvare din perimenopauză.

Material și metodă: Studiul a fost efectuat în serviciile de dermatologie și ginecologie ale Spitalului Clinic "Filantropia", Craiova, în perioada 2004-2006. Au fost descrise aspectele vulvocolposcopice la un lot de 35 femei cu vârste cuprinse între 45 și 52 de ani cu leziuni (sub)clinice vulvare. Videoimaginile găsite, după testul Collins și aplicații prelungite de acid acetic 5%, au sugerat trei grupuri de studiu, corespunzătoare elementelor diagnostice sugerate.

Rezultate: Au fost găsite 24 cazuri de **distrofie atrofică (LSA)**, 7 cazuri de **distrofie hiperplazică pură** (plăci multiceleulare) și 4 cazuri de **distrofie hiperplazică mixtă**.

Concluzii: Vulvosopia completează examinarea clinică necesară diagnosticării distrofiilor vulvare din perimenopauză.

Cuvinte cheie: distrofii vulvare, perimenopauză, vulvosopie.